


# EQUAL Candida Score 2018: An ECMM Score Derived From Current Guidelines to Measure **QUALITY** of Clinical Candidemia Management



Mellinghoff SC<sup>1,2</sup>, Köhler P<sup>1,2</sup>, Cornely OA<sup>1,2</sup>, Styczynski J<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> Department I for Internal Medicine, Excellence Center for Medical Mycology (ECMM), University of Cologne, Germany, <sup>2</sup> CECAD Cluster of Excellence, University of Cologne, Germany <sup>3</sup> Department of Pediatric Hematology and Oncology, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland.

DOI: 10.4126/FRL01-006414818

## WPROWADZENIE

Skala EQUAL Candida wartościuje i grupuje czynniki dla optymalnego postępowania w kandydemii i wspomaga zasady zarządzania p/grzybiczego oraz mierzy zgodność postępowania z rekomendacjami. Karta odzwierciedla aktualne najsilniejsze zalecenia *ESCMID*<sup>4,5</sup> oraz *IDSA*<sup>3</sup> wybrane jako podstawa ocen punktowej w tej Karcie.

## MAKSYMALNA PUNKTACJA

### Bez cewnika centralnego

Rozpoznanie 10

Leczenie 7

Dalsza opieka 2

**RAZEM 19**

### Z cewnikiem centralnym

Rozpoznanie 10

Leczenie 10

Dalsza opieka 2

**RAZEM 22**

## PIŚMIENNICTWO

1. Mellinghoff et al. *Mycoses* 2018; 2. Koehler et al. *Mycoses* 2014; 3. Pappas et al. *Clin Infect Dis* 2016; 4. Cuenca-Estrella et al. *Clin Infect Dis* 2012; 5. Cornely et al. *Clin Microbiol Infect* 2012; 6. Munoz et al. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2017; 7. Andes et al. *Clin Infect Dis* 2012.

# PUNKTACJA KANDYDEMII (EQUAL Candida Score 2018) <sup>1,2</sup>

ROZPOZNANIE

Początkowy posiew krwi (40mL) <sup>3,4</sup>

3

Identyfikacja gatunku <sup>3,4</sup>

3

Badanie lekowrażliwości <sup>3,4</sup>

2

Echokardiografia <sup>3,5</sup>

1

Oftalmoskopia <sup>5,6</sup>

1

Terapia

Echinokandyna <sup>3,5</sup>

3

Zmiana na flukonazol w zależności od wyniku lekowrażliwości <sup>3,5</sup>

2

Leczenie 14 dni po pierwszym ujemnym posiewie <sup>3,5</sup>

2

Usunięcie cewnika centralnego <sup>3,5,7</sup>  
≤ 24 godz od rozpoznania  
24-72 godz od rozpoznania

3

2

\* Pacjenci z cewnikiem centralnym otrzymują dodatkowe punkty w ocenie punktowej

DALSZA  
OPIEKA

Kontrolny posiew krwi (co najmniej jeden dzień do negatywizacji) <sup>3,5</sup>

2



UNIKLINIK  
KÖLN



European Confederation of Medical Mycology



Center of Excellence in Clinical and Laboratory Mycology and Clinical Studies