

**EQUALs** poängkort för Candida, 2018: ECMMs poängräkning utgår från nuvarande riktlinjer och mäter kvaliteten vid handläggning av klinisk candidemi.


Cornely OA<sup>1,2</sup>, Köhler P<sup>1,2</sup>, Rutz J<sup>2</sup>, Mellinghoff SC<sup>1,2</sup>, Klingspor L<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Department I for Internal Medicine, Excellence Center for Medical Mycology (ECMM), University of Cologne, Germany,

<sup>2</sup> CECAD Cluster of Excellence, University of Cologne, Germany

<sup>3</sup> Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

DOI: 10.4126/FRL01-006417860



## Bakgrund

EQUAL's poängkort för Candida, värderar och summerar faktorer för optimal handläggning av candidemi. Det är ett verktyg för handläggning av svampinfektioner och för att mäta efterlevnaden av nuvarande riktlinjer. Riktlinjerna från European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases<sup>4,5</sup> och Infectious Diseases Society of America<sup>3</sup> har granskats och de starkaste rekommendationerna för handläggningens kvalitets valdes som grund för detta poängverktyg.

## Maximum Score

### Icke-CVK -bärare

Diagnos

10

Behandling

7

Uppföljning

2

Totalt

19

### CVK- bärare

Diagnos

10

Behandling

10

Uppföljning

2

Totalt

22

## ReferenSER

1. Mellinghoff et al. *Mycoses* 2018; 2. Koehler et al. *Mycoses* 2014; 3. Pappas et al. *Clin Infect Dis* 2016; 4. Cuenca-Estrella et al. *Clin Infect Dis* 2012; 5. Cornely et al. *Clin Microbiol Infect* 2012; 6. Munoz et al. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2017; 7. Andes et al. *Clin Infect Dis* 2012.

# EQUAL Candida Poängkort 2018 <sup>1,2</sup>

## Diagnostik

Initial blododling (40mL) <sup>3,4</sup>

3

Artidentifikation <sup>3,4</sup>

3

Resistensbestämning<sup>3,4</sup>

2

Eko-kardiografi <sup>3,5</sup>

1

Oftalmoskopi <sup>5,6</sup>

1

## Behandling

Echinocandinbehandling <sup>3,5</sup>

3

Trappa ner till flukonazol beroende på  
resistensbestämningresultat <sup>3,5</sup>

2

Behandling skall pågå 14 dagar efter första  
negativa uppföljningsodling <sup>3,5</sup>

2

CVK bärare\*: CVK borttages <sup>3,5,7</sup>  
≤ 24 tim efter diagnos  
> 24 < 72 tim efter diagnos

3

2

\* CVK bärare får extra poäng, total poängsumma skiljer sig således hos icke-CVK vs. CVK-bärare

## Uppföljning

Uppföljande blododlingar (åtminstone en per  
dag tills negativ) <sup>3,5</sup>

2



UNIKLINIK  
KÖLN

